


ENFERMERA JULIO

EVALUACIONES DE CONOCIMIENTO

Nivel Preguntas	Calificación Obtenida	Preguntas Correctas	Preguntas Incorrectas	Preguntas sin Contestar
Total	11/12	11	1	0



12



Fecha de Evaluación

Fecha Inicio : 15 de Julio del 2016

Hora Evaluación : 11:22:42

Tiempo Utilizado : 06 minuto(s) 40 segundo(s)

La presión arterial basal es aquella que se mide con la persona ha permanecido en reposo por lo menos 10 minutos

 a) Verdadero

La frecuencia cardiaca no es similar a tomar el pulso

 b) Falso

El índice de masa corporal es el resultado de una formula en la cual intervienen el peso, la talla y la obesidad de la personas

 b) Falso

El perímetro abdominal de la persona se mide colocando una cinta metrica al rededor de la cintura pasando por sobre la cicatriz umbilical.

 a) Verdadero

Responda cuál de las siguientes opciones es verdadera al respecto de la toma de signos vitales:

 c) Toda personas debe ser valorada presión arterial, pulso, respiración y temperatura

Responda a qué patología corresponde una persona que desde la madrugada presenta 10 vomitos, 15 diarreas, fiebre, llega al consultorio pálida, piel sudorosa y fría con mucosas secas, presión arterial 80/40, pulso 120 x minuto: marque con una x la respuesta correcta:

 a) Shock séptico

Indique la respuesta correcta a la siguiente pregunta (marque con una x la correcta). Las soluciones oleosas se inyectan por vía:

 b) Intramuscular

Se debe tomar el peso de una persona en la medida de lo posible sin ropa, sin zapatos, sin objetos de valor

 a) Verdadero

La talla de los pacientes se toma con zapatos puestos

 b) Falso

EL acceso intrevenoso en casos de shock hipovolemico debe realizarse con catlon N.- 21

 b) Falso

La oximetría de pulso revela la cantidad de CO2 circulando en la sangre

 b) Falso

El personal de enfermería nunca debe administrar medicamentos sin prescripción medica

 a) Verdadero

