



## Introducción



### ESTRÉS GRUPO CÉNTRICO FORMA A EVALUACIÓN DE ESTRES (JAVERIANA) FORMA A

Este instrumento está diseñado para evaluar síntomas reveladores de la presencia de reacciones de estrés, distribuidos en cuatro categorías principales según el tipo de síntomas de estrés: a) fisiológicos, b) comportamiento social c) intelectuales y laborales y d) psicoemocionales.

Está compuesto por 31 ítems de elección forzada en escala de Likert.

---

Los resultados presentados en este reporte se basan en las respuestas del candidato que ha respondido a la evaluación desde el **2017-05-02 04:24:37** hasta el **2017-05-02 04:29:12**



## Datos Personales




### ESTRÉS GRUPO CÉNTRICO FORMA A BATERÍA PSICOMÉTRICA

No. Identificación :	0502054117
Nombres :	DORIS GABRIELA
Apellidos :	CORDOVA BUNCES
Dirección :	CDLA.EJERCITO OE3-97 Y AV.JOSE GALLARDO
Teléfono :	022695079
Celular :	0998989235
Género :	FEMENINO
Estado Civil :	CASADO
Área de Estudio :	CONTABILIDAD / AUDITORÍA
Escolaridad :	OTRO
Fecha de Nacimiento :	1974-10-21

**ESTRÉS GRUPO CÉNTRICO FORMA A**  
BATERÍA PSICOMÉTRICA

	Sigla	Factor	Valor Obtenido	Promedio Proceso
1	SF	SÍNTOMAS FISIOLÓGICOS	23.70	12.23
2	SCS	SÍNTOMAS DE COMPORTAMIENTO SOCIAL	8.50	10.17
3	SIL	SÍNTOMAS INTELECTUALES Y LABORALES	5.50	3.69
4	SPSC	SÍNTOMAS PSICOEMOCIONALES	1.40	1.25



**Fecha de Evaluación**

Fecha Inicio : 02 de Mayo del 2017

Hora Evaluación : 04:24:37

Tiempo Utilizado : 04 minuto(s) 35 segundo(s)

### ESTRÉS GRUPO CÉNTRICO FORMA A BATERÍA PSICOMÉTRICA EVALUACIÓN DE ESTRES (JAVERIANA) FORMA A

#### SÍNTOMAS FISIOLÓGICOS

##### Nivel alto

La cantidad de síntomas y su frecuencia de presentación es indicativa de una respuesta de estrés alto. Los síntomas más críticos y frecuentes requieren intervención en el marco de un sistema de vigilancia epidemiológica. Además es muy importante identificar los factores de riesgo psicosocial intra y extralaboral que pudieran tener alguna relación con los efectos identificados.

#### SÍNTOMAS DE COMPORTAMIENTO SOCIAL

##### Nivel bajo

Es indicativo de baja frecuencia de síntomas de estrés y por tanto escasa afectación del estado general de salud. Es pertinente desarrollar acciones o programas de intervención, a fin de mantener la baja frecuencia de síntomas.

#### SÍNTOMAS INTELECTUALES Y LABORALES

##### Nivel muy bajo

Ausencia de síntomas de estrés u ocurrencia muy rara que no amerita desarrollar actividades de intervención específicas, salvo acciones o programas de promoción en salud.

#### SÍNTOMAS PSICOEMOCIONALES

##### Nivel muy bajo

Ausencia de síntomas de estrés u ocurrencia muy rara que no amerita desarrollar actividades de intervención específicas, salvo acciones o programas de promoción en salud.

Dolores en el cuello y espalda o tensión muscular.

Siempre

Problemas gastrointestinales, úlcera péptica, acidez, problemas digestivos o del colon.

Siempre

Problemas respiratorios.

A veces

Dolor de cabeza.

Casi siempre

Transtornos del sueño como somnolencia durante el día o desvelo en la noche.

A veces

Palpitaciones en el pecho o problemas cardíacos.

Nunca

Cambios fuertes del apetito.

A veces

Problemas relacionados con la función de los órganos genitales (impotencia, frigidez).

A veces

Dificultad en las relaciones familiares.

A veces

Dificultad para permanecer quieto o dificultad para iniciar actividades.

A veces

Dificultad en las relaciones con otras personas.

A veces

Sensación de aislamiento y desinterés.

Nunca

Sentimiento de sobrecarga de trabajo.

A veces

Dificultad para concentrarse, olvidos frecuentes.

A veces

A veces

Sentimiento de frustración, de no haber hecho lo que se quería en la vida.

A veces

Cansancio, tedio o desgano.

A veces

Disminución del rendimiento en el trabajo o poca creatividad.

Nunca

Deseo de no asistir al trabajo.

A veces

Bajo compromiso o poco interés con lo que se hace.

Nunca

Dificultad para tomar decisiones.

A veces

Deseo de cambiar de empleo.

A veces

Sentimiento de soledad y miedo.

Nunca

Sentimiento de irritabilidad, actitudes y pensamientos negativos.

A veces

Sentimiento de angustia, preocupación o tristeza.

A veces

consumo de drogas para aliviar la tensión o los nervios.

Nunca

Sentimientos de que "no vale nada", o "no sirve para nada".

Nunca

Consumo de bebidas alcohólicas o café o cigarrillo.

A veces

Sentimiento de que está perdiendo la razón.

Nunca

Comportamientos rígidos, obstinación o terquedad.

A veces

Sensación de no poder manejar los problemas de la vida.

Nunca

