



## Introducción



### ESTRÉS GRUPO CÉNTRICO FORMA A EVALUACIÓN DE ESTRES (JAVERIANA) FORMA A

Este instrumento está diseñado para evaluar síntomas reveladores de la presencia de reacciones de estrés, distribuidos en cuatro categorías principales según el tipo de síntomas de estrés: a) fisiológicos, b) comportamiento social c) intelectuales y laborales y d) psicoemocionales.

Está compuesto por 31 ítems de elección forzada en escala de Likert.

---

Los resultados presentados en este reporte se basan en las respuestas del candidato que ha respondido a la evaluación desde el **2017-04-28 07:25:26** hasta el **2017-04-28 07:27:34**



## Datos Personales




### ESTRÉS GRUPO CÉNTRICO FORMA A BATERÍA PSICOMÉTRICA

No. Identificación :	0106056492
Nombres :	CHRISTIAN FERNANDO
Apellidos :	SEGOVIA ZAMBRANO
Dirección :	
Teléfono :	
Celular :	
Género :	--
Estado Civil :	--
Área de Estudio :	GENERAL
Escolaridad :	GENERAL
Fecha de Nacimiento :	1969-12-31

**ESTRÉS GRUPO CÉNTRICO FORMA A**  
BATERÍA PSICOMÉTRICA

	Sigla	Factor	Valor Obtenido	Promedio Proceso
1	SF	SÍNTOMAS FISIOLÓGICOS	10.60	12.23
2	SCS	SÍNTOMAS DE COMPORTAMIENTO SOCIAL	15.90	10.17
3	SIL	SÍNTOMAS INTELECTUALES Y LABORALES	5.80	3.69
4	SPSC	SÍNTOMAS PSICOEMOCIONALES	0.90	1.25



**Fecha de Evaluación**

Fecha Inicio : 28 de Abril del 2017

Hora Evaluación : 07:25:26

Tiempo Utilizado : 02 minuto(s) 08 segundo(s)

**ESTRÉS GRUPO CÉNTRICO FORMA A**  
**BATERÍA PSICOMÉTRICA**  
**EVALUACIÓN DE ESTRES (JAVERIANA) FORMA A**

**SÍNTOMAS FISIOLÓGICOS**

**Nivel bajo**

Es indicativo de baja frecuencia de síntomas de estrés y por tanto escasa afectación del estado general de salud. Es pertinente desarrollar acciones o programas de intervención, a fin de mantener la baja frecuencia de síntomas.

**SÍNTOMAS DE COMPORTAMIENTO SOCIAL**

**Nivel medio**

La presentación de síntomas es indicativa de una respuesta de estrés moderada. Los síntomas más frecuentes y críticos ameritan observación y acciones sistemáticas de intervención para prevenir efectos perjudiciales en la salud. Además, se sugiere identificar los factores de riesgo psicosocial intra y extralaboral que pudieran tener alguna relación con los efectos identificados.

**SÍNTOMAS INTELECTUALES Y LABORALES**

**Nivel muy bajo**

Ausencia de síntomas de estrés u ocurrencia muy rara que no amerita desarrollar actividades de intervención específicas, salvo acciones o programas de promoción en salud.

**SÍNTOMAS PSICOEMOCIONALES**

**Nivel muy bajo**

Ausencia de síntomas de estrés u ocurrencia muy rara que no amerita desarrollar actividades de intervención específicas, salvo acciones o programas de promoción en salud.

Dolores en el cuello y espalda o tensión muscular.

A veces

Problemas gastrointestinales, úlcera péptica, acidez, problemas digestivos o del colon.

A veces

Problemas respiratorios.

Nunca

Dolor de cabeza.

A veces

Trastornos del sueño como somnolencia durante el día o desvelo en la noche.

A veces

Palpitaciones en el pecho o problemas cardíacos.

A veces

Cambios fuertes del apetito.

A veces

Problemas relacionados con la función de los órganos genitales (impotencia, frigidez).

Nunca

Dificultad en las relaciones familiares.

Casi siempre

Dificultad para permanecer quieto o dificultad para iniciar actividades.

Casi siempre

Dificultad en las relaciones con otras personas.

A veces

Sensación de aislamiento y desinterés.

A veces

Sentimiento de sobrecarga de trabajo.

Casi siempre

Dificultad para concentrarse, olvidos frecuentes.

Casi siempre

A veces

Sentimiento de frustración, de no haber hecho lo que se quería en la vida.

Nunca

Cansancio, tedio o desgano.

Nunca

Disminución del rendimiento en el trabajo o poca creatividad.

A veces

Deseo de no asistir al trabajo.

Nunca

Bajo compromiso o poco interés con lo que se hace.

Nunca

Dificultad para tomar decisiones.

Nunca

Deseo de cambiar de empleo.

A veces

Sentimiento de soledad y miedo.

Nunca

Sentimiento de irritabilidad, actitudes y pensamientos negativos.

Nunca

Sentimiento de angustia, preocupación o tristeza.

A veces

consumo de drogas para aliviar la tensión o los nervios.

Nunca

Sentimientos de que "no vale nada", o "no sirve para nada".

Nunca

Consumo de bebidas alcohólicas o café o cigarrillo.

A veces

Sentimiento de que está perdiendo la razón.

Nunca

Comportamientos rígidos, obstinación o terquedad.

Nunca

Sensación de no poder manejar los problemas de la vida.

A veces

