



Introducción



ESTRÉS GRUPO CÉNTRICO FORMA B EVALUACIÓN DE ESTRES (JAVERIANA) FORMA B

Este instrumento está diseñado para evaluar síntomas reveladores de la presencia de reacciones de estrés, distribuidos en cuatro categorías principales según el tipo de síntomas de estrés: a) fisiológicos, b) comportamiento social c) intelectuales y laborales y d) psicoemocionales.

Está compuesto por 31 ítems de elección forzada en escala de Likert.

Los resultados presentados en este reporte se basan en las respuestas del candidato que ha respondido a la evaluación desde el **2017-05-02 11:05:56** hasta el **2017-05-02 11:09:11**



Datos Personales




ESTRÉS GRUPO CÉNTRICO FORMA B BATERÍA PSICOMÉTRICA

No. Identificación :	0604670257
Nombres :	KARLA ANDREA
Apellidos :	IÑIGUEZ ROMERO
Dirección :	
Teléfono :	
Celular :	
Género :	FEMENINO
Estado Civil :	SOLTERO
Área de Estudio :	CONTABILIDAD / AUDITORÍA
Escolaridad :	ESTUDIANTE UNIVERSITARIO
Fecha de Nacimiento :	1992-09-03

ESTRÉS GRUPO CÉNTRICO FORMA B
BATERÍA PSICOMÉTRICA

	Sigla	Factor	Valor Obtenido	Promedio Proceso
1	SF	SÍNTOMAS FISIOLÓGICOS	17.90	10.09
2	SCS	SÍNTOMAS DE COMPORTAMIENTO SOCIAL	17.10	6.82
3	SIL	SÍNTOMAS INTELECTUALES Y LABORALES	8.50	3.75
4	SPSC	SÍNTOMAS PSICOEMOCIONALES	5.20	1.50



Fecha de Evaluación

Fecha Inicio : 02 de Mayo del 2017

Hora Evaluación : 11:05:56

Tiempo Utilizado : 03 minuto(s) 15 segundo(s)

ESTRÉS GRUPO CÉNTRICO FORMA B BATERÍA PSICOMÉTRICA EVALUACIÓN DE ESTRÉS (JAVERIANA) FORMA B

SÍNTOMAS FISIOLÓGICOS

Nivel alto

La cantidad de síntomas y su frecuencia de presentación es indicativa de una respuesta de estrés alto. Los síntomas más críticos y frecuentes requieren intervención en el marco de un sistema de vigilancia epidemiológica. Además es muy importante identificar los factores de riesgo psicosocial intra y extralaboral que pudieran tener alguna relación con los efectos identificados.

SÍNTOMAS DE COMPORTAMIENTO SOCIAL

Nivel alto

La cantidad de síntomas y su frecuencia de presentación es indicativa de una respuesta de estrés alto. Los síntomas más críticos y frecuentes requieren intervención en el marco de un sistema de vigilancia epidemiológica. Además es muy importante identificar los factores de riesgo psicosocial intra y extralaboral que pudieran tener alguna relación con los efectos identificados.

SÍNTOMAS INTELECTUALES Y LABORALES

Nivel bajo

Es indicativo de baja frecuencia de síntomas de estrés y por tanto escasa afectación del estado general de salud. Es pertinente desarrollar acciones o programas de intervención, a fin de mantener la baja frecuencia de síntomas.

SÍNTOMAS PSICOEMOCIONALES

Nivel muy bajo

Ausencia de síntomas de estrés u ocurrencia muy rara que no amerita desarrollar actividades de intervención específicas, salvo acciones o programas de promoción en salud.

Dolores en el cuello y espalda o tensión muscular.

Casi siempre

Problemas gastrointestinales, úlcera péptica, acidez, problemas digestivos o del colon.

A veces

Problemas respiratorios.

Nunca

Dolor de cabeza.

Casi siempre

Transtornos del sueño como somnolencia durante el día o desvelo en la noche.

Siempre

Palpitaciones en el pecho o problemas cardíacos.

Nunca

Cambios fuertes del apetito.

Siempre

Problemas relacionados con la función de los órganos genitales (impotencia, frigidez).

Nunca

Dificultad en las relaciones familiares.

A veces

Dificultad para permanecer quieto o dificultad para iniciar actividades.

Casi siempre

Dificultad en las relaciones con otras personas.

Siempre

Sensación de aislamiento y desinterés.

A veces

Sentimiento de sobrecarga de trabajo.

A veces

Dificultad para concentrarse, olvidos frecuentes.

Casi siempre

Nunca

Sentimiento de frustración, de no haber hecho lo que se quería en la vida.

Siempre

Cansancio, tedio o desgano.

A veces

Disminución del rendimiento en el trabajo o poca creatividad.

A veces

Deseo de no asistir al trabajo.

A veces

Bajo compromiso o poco interés con lo que se hace.

A veces

Dificultad para tomar decisiones.

Casi siempre

Deseo de cambiar de empleo.

Casi siempre

Sentimiento de soledad y miedo.

Casi siempre

Sentimiento de irritabilidad, actitudes y pensamientos negativos.

Casi siempre

Sentimiento de angustia, preocupación o tristeza.

Casi siempre

Consumo de drogas para aliviar la tensión o los nervios.

Nunca

Sentimientos de que "no vale nada", o "no sirve para nada".

A veces

Consumo de bebidas alcohólicas o café o cigarrillo.

Casi siempre

Sentimiento de que está perdiendo la razón.

Siempre

Comportamientos rígidos, obstinación o terquedad.

A veces

Sensación de no poder manejar los problemas de la vida.

Siempre

