



## Introducción



### ESTRÉS GRUPO CÉNTRICO FORMA B EVALUACIÓN DE ESTRES (JAVERIANA) FORMA B

Este instrumento está diseñado para evaluar síntomas reveladores de la presencia de reacciones de estrés, distribuidos en cuatro categorías principales según el tipo de síntomas de estrés: a) fisiológicos, b) comportamiento social c) intelectuales y laborales y d) psicoemocionales.

Está compuesto por 31 ítems de elección forzada en escala de Likert.

---

Los resultados presentados en este reporte se basan en las respuestas del candidato que ha respondido a la evaluación desde el **2017-04-25 02:12:59** hasta el **2017-04-25 02:15:06**



## Datos Personales




### ESTRÉS GRUPO CÉNTRICO FORMA B BATERÍA PSICOMÉTRICA

No. Identificación :	1714045364
Nombres :	PEDRO ANDRES
Apellidos :	PAEZ FERRI
Dirección :	JOSÉ QUERI N40-40
Teléfono :	022920472
Celular :	0997602405
Género :	MASCULINO
Estado Civil :	SOLTERO
Área de Estudio :	PERIODISMO
Escolaridad :	UNIVERSITARIO
Fecha de Nacimiento :	1991-09-21

**ESTRÉS GRUPO CÉNTRICO FORMA B**  
BATERÍA PSICOMÉTRICA

	Sigla	Factor	Valor Obtenido	Promedio Proceso
1	SF	SÍNTOMAS FISIOLÓGICOS	8.90	9.91
2	SCS	SÍNTOMAS DE COMPORTAMIENTO SOCIAL	7.30	6.82
3	SIL	SÍNTOMAS INTELECTUALES Y LABORALES	6.50	3.75
4	SPSC	SÍNTOMAS PSICOEMOCIONALES	3.00	1.50



**Fecha de Evaluación**

Fecha Inicio : 25 de Abril del 2017

Hora Evaluación : 02:12:59

Tiempo Utilizado : 02 minuto(s) 07 segundo(s)

**ESTRÉS GRUPO CÉNTRICO FORMA B**  
BATERÍA PSICOMÉTRICA  
EVALUACIÓN DE ESTRÉS (JAVERIANA) FORMA B

**SÍNTOMAS FISIOLÓGICOS**

**Nivel bajo**

Es indicativo de baja frecuencia de síntomas de estrés y por tanto escasa afectación del estado general de salud. Es pertinente desarrollar acciones o programas de intervención, a fin de mantener la baja frecuencia de síntomas.

**SÍNTOMAS DE COMPORTAMIENTO SOCIAL**

**Nivel bajo**

Es indicativo de baja frecuencia de síntomas de estrés y por tanto escasa afectación del estado general de salud. Es pertinente desarrollar acciones o programas de intervención, a fin de mantener la baja frecuencia de síntomas.

**SÍNTOMAS INTELECTUALES Y LABORALES**

**Nivel muy bajo**

Ausencia de síntomas de estrés u ocurrencia muy rara que no amerita desarrollar actividades de intervención específicas, salvo acciones o programas de promoción en salud.

**SÍNTOMAS PSICOEMOCIONALES**

**Nivel muy bajo**

Ausencia de síntomas de estrés u ocurrencia muy rara que no amerita desarrollar actividades de intervención específicas, salvo acciones o programas de promoción en salud.

Dolores en el cuello y espalda o tensión muscular.

A veces

Problemas gastrointestinales, úlcera péptica, acidez, problemas digestivos o del colon.

A veces

Problemas respiratorios.

Nunca

Dolor de cabeza.

A veces

Transtornos del sueño como somnolencia durante el día o desvelo en la noche.

A veces

Palpitaciones en el pecho o problemas cardíacos.

Nunca

Cambios fuertes del apetito.

A veces

Problemas relacionados con la función de los órganos genitales (impotencia, frigidez).

Nunca

Dificultad en las relaciones familiares.

A veces

Dificultad para permanecer quieto o dificultad para iniciar actividades.

A veces

Dificultad en las relaciones con otras personas.

Nunca

Sensación de aislamiento y desinterés.

A veces

Sentimiento de sobrecarga de trabajo.

Casi siempre

Dificultad para concentrarse, olvidos frecuentes.

A veces

Nunca

Sentimiento de frustración, de no haber hecho lo que se quería en la vida.

A veces

Cansancio, tedio o desgano.

A veces

Disminución del rendimiento en el trabajo o poca creatividad.

A veces

Deseo de no asistir al trabajo.

A veces

Bajo compromiso o poco interés con lo que se hace.

A veces

Dificultad para tomar decisiones.

A veces

Deseo de cambiar de empleo.

A veces

Sentimiento de soledad y miedo.

A veces

Sentimiento de irritabilidad, actitudes y pensamientos negativos.

A veces

Sentimiento de angustia, preocupación o tristeza.

A veces

Consumo de drogas para aliviar la tensión o los nervios.

A veces

Sentimientos de que "no vale nada", o "no sirve para nada".

A veces

Consumo de bebidas alcohólicas o café o cigarrillo.

Casi siempre

Sentimiento de que está perdiendo la razón.

Nunca

Comportamientos rígidos, obstinación o terquedad.

Nunca

Sensación de no poder manejar los problemas de la vida.

A veces

