



Introducción



ESTRÉS GRUPO CÉNTRICO FORMA B EVALUACIÓN DE ESTRES (JAVERIANA) FORMA B

Este instrumento está diseñado para evaluar síntomas reveladores de la presencia de reacciones de estrés, distribuidos en cuatro categorías principales según el tipo de síntomas de estrés: a) fisiológicos, b) comportamiento social c) intelectuales y laborales y d) psicoemocionales.

Está compuesto por 31 ítems de elección forzada en escala de Likert.

Los resultados presentados en este reporte se basan en las respuestas del candidato que ha respondido a la evaluación desde el **2017-04-28 06:34:39** hasta el **2017-04-28 06:36:34**



Datos Personales




ESTRÉS GRUPO CÉNTRICO FORMA B BATERÍA PSICOMÉTRICA

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| No. Identificación : | 1721740023 |
| Nombres : | ALEXIS JAVIER |
| Apellidos : | CRUZ FLORES |
| Dirección : | LOYOLA OE6-255 Y GRAL GUERRERO |
| Teléfono : | 5107227 |
| Celular : | 0987056691 |
| Género : | MASCULINO |
| Estado Civil : | SOLTERO |
| Área de Estudio : | ADM. DE EMPRESAS |
| Escolaridad : | ESTUDIANTE UNIVERSITARIO |
| Fecha de Nacimiento : | 1992-11-29 |

ESTRÉS GRUPO CÉNTRICO FORMA B
BATERÍA PSICOMÉTRICA

| | Sigla | Factor | Valor Obtenido | Promedio Proceso |
|---|-------|------------------------------------|----------------|------------------|
| 1 | SF | SÍNTOMAS FISIOLÓGICOS | 8.90 | 10.09 |
| 2 | SCS | SÍNTOMAS DE COMPORTAMIENTO SOCIAL | 9.80 | 6.82 |
| 3 | SIL | SÍNTOMAS INTELECTUALES Y LABORALES | 5.50 | 3.75 |
| 4 | SPSC | SÍNTOMAS PSICOEMOCIONALES | 1.60 | 1.50 |



Fecha de Evaluación

Fecha Inicio : 28 de Abril del 2017

Hora Evaluación : 06:34:39

Tiempo Utilizado : 01 minuto(s) 55 segundo(s)

ESTRÉS GRUPO CÉNTRICO FORMA B
BATERÍA PSICOMÉTRICA
EVALUACIÓN DE ESTRÉS (JAVERIANA) FORMA B

SÍNTOMAS FISIOLÓGICOS

Nivel bajo

Es indicativo de baja frecuencia de síntomas de estrés y por tanto escasa afectación del estado general de salud. Es pertinente desarrollar acciones o programas de intervención, a fin de mantener la baja frecuencia de síntomas.

SÍNTOMAS DE COMPORTAMIENTO SOCIAL

Nivel bajo

Es indicativo de baja frecuencia de síntomas de estrés y por tanto escasa afectación del estado general de salud. Es pertinente desarrollar acciones o programas de intervención, a fin de mantener la baja frecuencia de síntomas.

SÍNTOMAS INTELECTUALES Y LABORALES

Nivel muy bajo

Ausencia de síntomas de estrés u ocurrencia muy rara que no amerita desarrollar actividades de intervención específicas, salvo acciones o programas de promoción en salud.

SÍNTOMAS PSICOEMOCIONALES

Nivel muy bajo

Ausencia de síntomas de estrés u ocurrencia muy rara que no amerita desarrollar actividades de intervención específicas, salvo acciones o programas de promoción en salud.

Dolores en el cuello y espalda o tensión muscular.

A veces

Problemas gastrointestinales, úlcera péptica, acidez, problemas digestivos o del colon.

Nunca

Problemas respiratorios.

A veces

Dolor de cabeza.

A veces

Trastornos del sueño como somnolencia durante el día o desvelo en la noche.

A veces

Palpitaciones en el pecho o problemas cardíacos.

Nunca

Cambios fuertes del apetito.

A veces

Problemas relacionados con la función de los órganos genitales (impotencia, frigidez).

Nunca

Dificultad en las relaciones familiares.

A veces

Dificultad para permanecer quieto o dificultad para iniciar actividades.

A veces

Dificultad en las relaciones con otras personas.

A veces

Sensación de aislamiento y desinterés.

A veces

Sentimiento de sobrecarga de trabajo.

A veces

Dificultad para concentrarse, olvidos frecuentes.

A veces

Nunca

Sentimiento de frustración, de no haber hecho lo que se quería en la vida.

A veces

Cansancio, tedio o desgano.

A veces

Disminución del rendimiento en el trabajo o poca creatividad.

A veces

Deseo de no asistir al trabajo.

A veces

Bajo compromiso o poco interés con lo que se hace.

A veces

Dificultad para tomar decisiones.

A veces

Deseo de cambiar de empleo.

A veces

Sentimiento de soledad y miedo.

Nunca

Sentimiento de irritabilidad, actitudes y pensamientos negativos.

A veces

Sentimiento de angustia, preocupación o tristeza.

A veces

Consumo de drogas para aliviar la tensión o los nervios.

Nunca

Sentimientos de que "no vale nada", o "no sirve para nada".

A veces

Consumo de bebidas alcohólicas o café o cigarrillo.

Nunca

Sentimiento de que está perdiendo la razón.

Nunca

Comportamientos rígidos, obstinación o terquedad.

A veces

Sensación de no poder manejar los problemas de la vida.

A veces

