



Introducción



ESTRÉS GRUPO CÉNTRICO FORMA B EVALUACIÓN DE ESTRES (JAVERIANA) FORMA B

Este instrumento está diseñado para evaluar síntomas reveladores de la presencia de reacciones de estrés, distribuidos en cuatro categorías principales según el tipo de síntomas de estrés: a) fisiológicos, b) comportamiento social c) intelectuales y laborales y d) psicoemocionales.

Está compuesto por 31 ítems de elección forzada en escala de Likert.

Los resultados presentados en este reporte se basan en las respuestas del candidato que ha respondido a la evaluación desde el **2017-04-25 12:58:44** hasta el **2017-04-25 01:04:15**



Datos Personales




ESTRÉS GRUPO CÉNTRICO FORMA B BATERÍA PSICOMÉTRICA

No. Identificación :	1713724027
Nombres :	MARIA CRISTINA
Apellidos :	NIÑO VELANDIA
Dirección :	CALLE LALAMA URB.EL HUERTO DE NAYON LOTE 49
Teléfono :	096984479
Celular :	0969844790
Género :	FEMENINO
Estado Civil :	VIUDO
Área de Estudio :	MARKETING / COMERCIALIZACIÓN
Escolaridad :	UNIVERSITARIO
Fecha de Nacimiento :	1964-08-01

ESTRÉS GRUPO CÉNTRICO FORMA B BATERÍA PSICOMÉTRICA

	Sigla	Factor	Valor Obtenido	Promedio Proceso
1	SF	SÍNTOMAS FISIOLÓGICOS	8.10	10.09
2	SCS	SÍNTOMAS DE COMPORTAMIENTO SOCIAL	9.80	6.82
3	SIL	SÍNTOMAS INTELECTUALES Y LABORALES	2.60	3.75
4	SPSC	SÍNTOMAS PSICOEMOCIONALES	1.60	1.50



Fecha de Evaluación

Fecha Inicio : 25 de Abril del 2017

Hora Evaluación : 12:58:44

Tiempo Utilizado : -11 hora(s) 54 minuto(s) 29 segundo(s)

ESTRÉS GRUPO CÉNTRICO FORMA B
BATERÍA PSICOMÉTRICA
EVALUACIÓN DE ESTRÉS (JAVERIANA) FORMA B

SÍNTOMAS FISIOLÓGICOS**Nivel bajo**

Es indicativo de baja frecuencia de síntomas de estrés y por tanto escasa afectación del estado general de salud. Es pertinente desarrollar acciones o programas de intervención, a fin de mantener la baja frecuencia de síntomas.

SÍNTOMAS DE COMPORTAMIENTO SOCIAL**Nivel bajo**

Es indicativo de baja frecuencia de síntomas de estrés y por tanto escasa afectación del estado general de salud. Es pertinente desarrollar acciones o programas de intervención, a fin de mantener la baja frecuencia de síntomas.

SÍNTOMAS INTELECTUALES Y LABORALES**Nivel muy bajo**

Ausencia de síntomas de estrés u ocurrencia muy rara que no amerita desarrollar actividades de intervención específicas, salvo acciones o programas de promoción en salud.

SÍNTOMAS PSICOEMOCIONALES**Nivel muy bajo**

Ausencia de síntomas de estrés u ocurrencia muy rara que no amerita desarrollar actividades de intervención específicas, salvo acciones o programas de promoción en salud.

Dolores en el cuello y espalda o tensión muscular.

A veces

Problemas gastrointestinales, úlcera péptica, acidez, problemas digestivos o del colon.

Nunca

Problemas respiratorios.

Nunca

Dolor de cabeza.

Casi siempre

Trastornos del sueño como somnolencia durante el día o desvelo en la noche.

A veces

Palpitaciones en el pecho o problemas cardíacos.

Nunca

Cambios fuertes del apetito.

A veces

Problemas relacionados con la función de los órganos genitales (impotencia, frigidez).

Nunca

Dificultad en las relaciones familiares.

A veces

Dificultad para permanecer quieto o dificultad para iniciar actividades.

A veces

Dificultad en las relaciones con otras personas.

A veces

Sensación de aislamiento y desinterés.

A veces

Sentimiento de sobrecarga de trabajo.

Nunca

Dificultad para concentrarse, olvidos frecuentes.

A veces

Nunca

Sentimiento de frustración, de no haber hecho lo que se quería en la vida.

A veces

Cansancio, tedio o desgano.

A veces

Disminución del rendimiento en el trabajo o poca creatividad.

Nunca

Deseo de no asistir al trabajo.

Nunca

Bajo compromiso o poco interés con lo que se hace.

Nunca

Dificultad para tomar decisiones.

A veces

Deseo de cambiar de empleo.

Nunca

Sentimiento de soledad y miedo.

A veces

Sentimiento de irritabilidad, actitudes y pensamientos negativos.

A veces

Sentimiento de angustia, preocupación o tristeza.

A veces

Consumo de drogas para aliviar la tensión o los nervios.

Nunca

Sentimientos de que "no vale nada", o "no sirve para nada".

Nunca

Consumo de bebidas alcohólicas o café o cigarrillo.

Nunca

Sentimiento de que está perdiendo la razón.

Nunca

Comportamientos rígidos, obstinación o terquedad.

Nunca

Sensación de no poder manejar los problemas de la vida.

A veces

