



Introducción



ESTRÉS GRUPO CÉNTRICO FORMA B EVALUACIÓN DE ESTRES (JAVERIANA) FORMA B

Este instrumento está diseñado para evaluar síntomas reveladores de la presencia de reacciones de estrés, distribuidos en cuatro categorías principales según el tipo de síntomas de estrés: a) fisiológicos, b) comportamiento social c) intelectuales y laborales y d) psicoemocionales.

Está compuesto por 31 ítems de elección forzada en escala de Likert.

Los resultados presentados en este reporte se basan en las respuestas del candidato que ha respondido a la evaluación desde el **2017-05-02 02:07:13** hasta el **2017-05-02 02:22:42**



Datos Personales




ESTRÉS GRUPO CÉNTRICO FORMA B BATERÍA PSICOMÉTRICA

No. Identificación :	1721306361
Nombres :	GIOVANNY JAVIER
Apellidos :	MONTALVO CEPEDA
Dirección :	BILOXI ALTA, CALLE 15 Y 10 CJTO TERRAZAS DEL PICHINCHA NO 183
Teléfono :	2632262
Celular :	0987308851
Género :	MASCULINO
Estado Civil :	SOLTERO
Área de Estudio :	ANÁLISIS DE SISTEMAS
Escolaridad :	TECNICO
Fecha de Nacimiento :	1991-04-18

ESTRÉS GRUPO CÉNTRICO FORMA B BATERÍA PSICOMÉTRICA

	Sigla	Factor	Valor Obtenido	Promedio Proceso
1	SF	SÍNTOMAS FISIOLÓGICOS	18.80	9.91
2	SCS	SÍNTOMAS DE COMPORTAMIENTO SOCIAL	8.50	6.82
3	SIL	SÍNTOMAS INTELECTUALES Y LABORALES	5.50	3.75
4	SPSC	SÍNTOMAS PSICOEMOCIONALES	2.50	1.50



Fecha de Evaluación

Fecha Inicio : 02 de Mayo del 2017

Hora Evaluación : 02:07:13

Tiempo Utilizado : 15 minuto(s) 29 segundo(s)

ESTRÉS GRUPO CÉNTRICO FORMA B
BATERÍA PSICOMÉTRICA
EVALUACIÓN DE ESTRÉS (JAVERIANA) FORMA B

SÍNTOMAS FISIOLÓGICOS**Nivel alto**

La cantidad de síntomas y su frecuencia de presentación es indicativa de una respuesta de estrés alto. Los síntomas más críticos y frecuentes requieren intervención en el marco de un sistema de vigilancia epidemiológica. Además es muy importante identificar los factores de riesgo psicosocial intra y extralaboral que pudieran tener alguna relación con los efectos identificados.

SÍNTOMAS DE COMPORTAMIENTO SOCIAL**Nivel bajo**

Es indicativo de baja frecuencia de síntomas de estrés y por tanto escasa afectación del estado general de salud. Es pertinente desarrollar acciones o programas de intervención, a fin de mantener la baja frecuencia de síntomas.

SÍNTOMAS INTELECTUALES Y LABORALES**Nivel muy bajo**

Ausencia de síntomas de estrés u ocurrencia muy rara que no amerita desarrollar actividades de intervención específicas, salvo acciones o programas de promoción en salud.

SÍNTOMAS PSICOEMOCIONALES**Nivel muy bajo**

Ausencia de síntomas de estrés u ocurrencia muy rara que no amerita desarrollar actividades de intervención específicas, salvo acciones o programas de promoción en salud.

Dolores en el cuello y espalda o tensión muscular.

Siempre

Problemas gastrointestinales, úlcera péptica, acidez, problemas digestivos o del colon.

A veces

Problemas respiratorios.

Nunca

Dolor de cabeza.

A veces

Trastornos del sueño como somnolencia durante el día o desvelo en la noche.

Casi siempre

Palpitaciones en el pecho o problemas cardíacos.

A veces

Cambios fuertes del apetito.

Siempre

Problemas relacionados con la función de los órganos genitales (impotencia, frigidez).

Nunca

Dificultad en las relaciones familiares.

Nunca

Dificultad para permanecer quieto o dificultad para iniciar actividades.

A veces

Dificultad en las relaciones con otras personas.

Casi siempre

Sensación de aislamiento y desinterés.

A veces

Sentimiento de sobrecarga de trabajo.

A veces

Dificultad para concentrarse, olvidos frecuentes.

A veces

A veces

Sentimiento de frustración, de no haber hecho lo que se quería en la vida.

Nunca

Cansancio, tedio o desgano.

Casi siempre

Disminución del rendimiento en el trabajo o poca creatividad.

A veces

Deseo de no asistir al trabajo.

Nunca

Bajo compromiso o poco interés con lo que se hace.

Nunca

Dificultad para tomar decisiones.

Casi siempre

Deseo de cambiar de empleo.

Nunca

Sentimiento de soledad y miedo.

Casi siempre

Sentimiento de irritabilidad, actitudes y pensamientos negativos.

Nunca

Sentimiento de angustia, preocupación o tristeza.

A veces

Consumo de drogas para aliviar la tensión o los nervios.

Nunca

Sentimientos de que "no vale nada", o "no sirve para nada".

A veces

Consumo de bebidas alcohólicas o café o cigarrillo.

A veces

Sentimiento de que está perdiendo la razón.

Nunca

Comportamientos rígidos, obstinación o terquedad.

A veces

Sensación de no poder manejar los problemas de la vida.

A veces

