



## Introducción



### ESTRÉS GRUPO CÉNTRICO FORMA B EVALUACIÓN DE ESTRES (JAVERIANA) FORMA B

Este instrumento está diseñado para evaluar síntomas reveladores de la presencia de reacciones de estrés, distribuidos en cuatro categorías principales según el tipo de síntomas de estrés: a) fisiológicos, b) comportamiento social c) intelectuales y laborales y d) psicoemocionales.

Está compuesto por 31 ítems de elección forzada en escala de Likert.

---

Los resultados presentados en este reporte se basan en las respuestas del candidato que ha respondido a la evaluación desde el **2017-04-28 11:37:40** hasta el **2017-04-28 12:49:02**



## Datos Personales




### ESTRÉS GRUPO CÉNTRICO FORMA B BATERÍA PSICOMÉTRICA

No. Identificación :	1721784005
Nombres :	MARIA JOSE
Apellidos :	JIMENEZ MUÑOZ
Dirección :	AV.ELOY ALFARO Y CALLE N74C
Teléfono :	2800700
Celular :	0992730891
Género :	FEMENINO
Estado Civil :	DIVORCIADO
Área de Estudio :	RECURSOS HUMANOS / RELAC. IND.
Escolaridad :	UNIVERSITARIO
Fecha de Nacimiento :	1987-04-08

**ESTRÉS GRUPO CÉNTRICO FORMA B**  
BATERÍA PSICOMÉTRICA

	Sigla	Factor	Valor Obtenido	Promedio Proceso
1	SF	SÍNTOMAS FISIOLÓGICOS	22.00	9.91
2	SCS	SÍNTOMAS DE COMPORTAMIENTO SOCIAL	4.90	6.82
3	SIL	SÍNTOMAS INTELECTUALES Y LABORALES	4.50	3.75
4	SPSC	SÍNTOMAS PSICOEMOCIONALES	2.70	1.50



**Fecha de Evaluación**

Fecha Inicio : 28 de Abril del 2017

Hora Evaluación : 11:37:40

Tiempo Utilizado : 01 hora(s) 11 minuto(s) 22 segundo(s)

### ESTRÉS GRUPO CÉNTRICO FORMA B BATERÍA PSICOMÉTRICA EVALUACIÓN DE ESTRES (JAVERIANA) FORMA B

#### SÍNTOMAS FISIOLÓGICOS

##### Nivel alto

La cantidad de síntomas y su frecuencia de presentación es indicativa de una respuesta de estrés alto. Los síntomas más críticos y frecuentes requieren intervención en el marco de un sistema de vigilancia epidemiológica. Además es muy importante identificar los factores de riesgo psicosocial intra y extralaboral que pudieran tener alguna relación con los efectos identificados.

#### SÍNTOMAS DE COMPORTAMIENTO SOCIAL

##### Nivel muy bajo

Ausencia de síntomas de estrés u ocurrencia muy rara que no amerita desarrollar actividades de intervención específicas, salvo acciones o programas de promoción en salud.

#### SÍNTOMAS INTELECTUALES Y LABORALES

##### Nivel muy bajo

Ausencia de síntomas de estrés u ocurrencia muy rara que no amerita desarrollar actividades de intervención específicas, salvo acciones o programas de promoción en salud.

#### SÍNTOMAS PSICOEMOCIONALES

##### Nivel muy bajo

Ausencia de síntomas de estrés u ocurrencia muy rara que no amerita desarrollar actividades de intervención específicas, salvo acciones o programas de promoción en salud.

Dolores en el cuello y espalda o tensión muscular.

Siempre

Problemas gastrointestinales, úlcera péptica, acidez, problemas digestivos o del colon.

Siempre

Problemas respiratorios.

A veces

Dolor de cabeza.

Casi siempre

Trastornos del sueño como somnolencia durante el día o desvelo en la noche.

A veces

Palpitaciones en el pecho o problemas cardíacos.

Nunca

Cambios fuertes del apetito.

Nunca

Problemas relacionados con la función de los órganos genitales (impotencia, frigidez).

Nunca

Dificultad en las relaciones familiares.

Nunca

Dificultad para permanecer quieto o dificultad para iniciar actividades.

A veces

Dificultad en las relaciones con otras personas.

A veces

Sensación de aislamiento y desinterés.

Nunca

Sentimiento de sobrecarga de trabajo.

A veces

Dificultad para concentrarse, olvidos frecuentes.

A veces

A veces

Sentimiento de frustración, de no haber hecho lo que se quería en la vida.

Nunca

Cansancio, tedio o desgano.

A veces

Disminución del rendimiento en el trabajo o poca creatividad.

A veces

Deseo de no asistir al trabajo.

Nunca

Bajo compromiso o poco interés con lo que se hace.

Nunca

Dificultad para tomar decisiones.

A veces

Deseo de cambiar de empleo.

Nunca

Sentimiento de soledad y miedo.

A veces

Sentimiento de irritabilidad, actitudes y pensamientos negativos.

A veces

Sentimiento de angustia, preocupación o tristeza.

A veces

Consumo de drogas para aliviar la tensión o los nervios.

A veces

Sentimientos de que "no vale nada", o "no sirve para nada".

Nunca

Consumo de bebidas alcohólicas o café o cigarrillo.

Casi siempre

Sentimiento de que está perdiendo la razón.

Nunca

Comportamientos rígidos, obstinación o terquedad.

A veces

Sensación de no poder manejar los problemas de la vida.

Nunca

